


نام و نام خانوادگی:	بسمه تعالی	تاریخ امتحان: ۱۴۰۲/۱۰/۱۳
پایه و رشته تحصیلی:	اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان	نام درس: شیمی
نام دبیر:	دبیرستان پسرانه محمد رسول الله	ساعت شروع:


بارم	
۲	۱- عبارت‌های زیر را با کلمه مناسب کامل کنید. (الف) اولین سری از عناصر واسطه در تناوب جدول دوره‌ای قرار می‌گیرند. (ب) در کشاورزی، برای رسیدن میوه‌های نارس از به عنوان عمل‌آورنده استفاده می‌شود. (پ) برای جلوگیری از پوکی استخوان باید در رژیم غذایی ما باشد. (ت) انرژی گرمایی یک لیوان آب 45°C یک پارچ آب 45°C است. (ث) در تولید لامپ چراغ‌های جلوی خودروها از استفاده می‌شود. (ج) رسانایی الکتریکی X_{24} از Y_{14} است. (چ) گرمای حاصل از سوختن یک گرم زغال سنگ از بنزین است. (ح) نقطه جوش آلکانی با ۱۲ کربن از آلکانی با ۲۲ هیدروژن است.
۱/۵	۲- عبارت مناسب را انتخاب کرده و دور آن خط بکشید. (الف) برم در (۲- متیل پنتان، ۲- هگزن) بی‌رنگ می‌شود. (ب) در فولاد مبارکه، برای استخراج آهن از (کربن، سدیم) استفاده می‌کنند. (پ) (سیکلوپنتان، نفتالن) یک ترکیب آروماتیک است. (ت) برای تشخیص یون‌های آهن، به محلول حاوی آن (سدیم هیدروکسید، سدیم نیترات) اضافه می‌کنیم، رنگ رسوب سبز نشان‌دهنده $(\text{Fe}^{3+}, \text{Fe}^{2+})$ است. (ث) در پالایشگاه‌ها ترکیباتی که از قسمت‌های بالای برج تقطیر جدا می‌شوند، نقطه جوش (کمتری، بیشتری) نسبت به محصولات پایینی برج دارند.
۱/۵	۳- درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کرده و شکل درست عبارات نادرست را بنویسید. (الف) استخراج فلز Zn از معدن دشوارتر Mg است. ص ☐ غ ☐ (ب) Si در اثر ضربه خرد می‌شود. ص ☐ غ ☐ (پ) نیروی بین مولکولی در آلکان‌ها از نوع هیدروژنی است. ص ☐ غ ☐ (ت) بازیافت فلزها به توسعه پایدار یک کشور کمک می‌کند و گونه‌های زیستی کمتری را از بین می‌برد. ص ☐ غ ☐

۴- با توجه به ترکیبات داده شده پاسخ دهید.


الف) ترکیبات ۱ و ۲ و ۳ را نام گذاری کنید.



۲/۲۵



ب) واکنش پذیری ترکیب (۱) بیشتر است یا (۲)؟ چرا؟



الف) کدام یک از عناصر فوق با تشکیل کاتیون به آرایش گاز نجیب می‌رسند؟

ب) کدام یک عنصر اصلی سازنده سلول‌های خورشیدی می‌باشد؟

پ) کدام یک فلزی محکم، کم‌چگال و مقاوم در برابر خوردگی می‌باشد که در بدنه دوچرخه کاربرد دارد؟

ت) استخراج کدام فلز به روش گیاه پالایی مقرون به صرفه است؟

۱

۶- پاسخ کوتاه دهید.

الف) کدام ویژگی در طلا سبب شده است تا در کلاه فضانوردان کاربرد داشته باشد:

ب) کدام ویژگی آلکان‌ها سبب می‌شود تا بتوان از آن‌ها برای حفاظت از فلزات استفاده کرد:

پ) گازی که از سوختن زغال سنگ تولید شده و منجر به بارش اسیدی می‌شود:

ت) ماده‌ای که دلیل اصلی اغلب انفجارهای معادن زغال سنگ است:

۱


۷- پاسخ دهید.

الف) چرا افرادی که با گریس کار می‌کنند، دستشان را با بنزین یا نفت می‌شویند؟


ب) آرایش الکترونی یون X^{2+} به $3d^9$ ختم می‌شود، آرایش الکترونی اتم X را بنویسید.

۱/۵

پ) میانگین تندی مولکول‌های اتانول را در هر دو ظرف با نوشتن دلیل مقایسه کنید.



۸- الف) واکنش‌های زیر را کامل کرده و به سؤالات پاسخ دهید.



ب) نام فرآورده واکنش ۱ و ۲ را بنویسید و یک کاربرد برای فرآورده ۲ بیان کنید.

۹- الف) فرمول ساختاری پیوند - خط را برای ۲، ۳، ۳، ۵- تترامتیل اکتان رسم کنید.

ب) فرمول ساختاری کامل ۲- بوتین را رسم کنید.




ج) در هریک از ظرف‌های مقابل، آلکان‌های $\text{C}_{15}\text{H}_{32}$ و $\text{C}_{11}\text{H}_{24}$ وجود دارند که برچسب نام هریک از روی ظروف پاک شده است. مشخص کنید که در هر ظرف کدام آلکان وجود دارد؟

۱۰- با توجه به جدول زیر پاسخ دهید.

فلز	آهن	نقره	مس
گرمای ویژه	۰/۴۵۱	۰/۲۳۵	۰/۳۸۵

الف) به ۸۰ گرم از فلزی خالص، ۱۸۸ ژول گرما می‌دهیم تا دمای آن از ۴۵ تا ۵۵ درجه سانتیگراد افزایش یابد. مشخص کنید این فلز کدام یک از فلزهای داده شده در جدول بالاست؟

ب) برای افزایش دمای یک گرم از کدام فلز به گرمای بیشتری نیاز داریم؟ چرا؟



۱۱- الف) واکنش مقابل چه نام دارد و در کجا کاربرد دارد؟

ب) با مصرف ۱۳۵ گرم آلومینیوم با درصد خلوص ۸۰ درصد، چند گرم آهن با بازده ۲۵ درصد تولید می‌شود؟

گروه دوره	۱۵	۱۶	۱۷
۲		A	B
۳	C	D	E
۴	F		G


۱۲- شکل زیر قسمتی از جدول تناوبی عناصر را نشان می‌دهد.

الف) اگر در سه بالن هم اندازه در شرایط یکسان که حاوی عناصر G, E, B می‌باشند، جرم یکسانی از تکه‌های پتاسیم بیاندازیم، در کدام بالن سرعت واکنش بیشتر است؟ چرا؟

ب) شعاع اتمی E, C را با ذکر دلیل با هم مقایسه نمایید؟

۱۳- از سوختن ۹۲ گرم اتانول در واکنش زیر، ۳۳/۶ لیتر گاز کربن دی‌اکسید در شرایط STP تولید می‌شود. بازده درصدی


واکنش را به‌دست آورید؟ ($\text{O} = ۱۶; \text{C} = ۱۲; \text{H} = ۱ \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$)



موفق باشید.

جمع بarm

پاسخنامه

۱- الف) چهارم (ب) اتن (پ) کلسیم (ت) کمتر (ث) هالوژن (ج) بیشتر (چ) کمتر (ح) بیشتر (هر مورد ۰/۲۵)	
۲- الف) هگزن (ب) کرین (پ) نفتالن (ت) سدیم هیدروکسید - Fe^{2+} (ث) کمتر (هر مورد ۰/۲۵)	
۳- الف) غ (راحت تر) (ب) ص (پ) غ (واندروالس ناقطبی) (ت) ص (هر مورد ۰/۲۵)	
۴- الف) ۱ ← ۲- هگزن ۲- ۳- اتیل ۵- متیل هپتان ۳- سیکلو هگزان ۰/۲۵ ۰/۲۵ ۰/۲۵ ۰/۲۵ ۰/۲۵ ۰/۲۵ ب) واکنش پذیری ترکیب (۱)، چون سیر نشده است و پیوند دوگانه دارد. ۰/۲۵ ۰/۲۵	
۵- الف) Sc (ب) Si_{14} (پ) Ti (ت) Cu (هر مورد ۰/۲۵)	
۶- الف) بازتاب پرتوهای خورشیدی (ب) ناقطبی بودن (نامحلول بودن در آب) پ) SO_2 گوگرد دی اکسید (ت) متان CH_4 (هر مورد ۰/۲۵)	
۷- الف) چون گریس و نفت حل شونده و حلال هر دو نیروی جاذبه ناقطبی و اندروالسی دارند، شبیه، شبیه را حل می کند. ب) $X:[_{18}Ar]3d^{10} / 4s^1$ پ) دما یکسان است، پس میانگین تندی هم یکسان است و به مقدار بستگی ندارد. (هر کدام ۰/۵ نمره)	
۸- ب) ۱، ۲ دی برم بوتان، ضد عفونی کننده در بیمارستان ها (۰/۲۵) الف) ۱) $CH_2-CH-CH_2-CH_3$ (الف) (۰/۲۵) $\begin{array}{c} \quad \\ Br \quad Br \end{array}$ ۲) CH_2-CH_2 یا CH_3CH_2OH اتانول $\begin{array}{c} \quad \\ H \quad OH \end{array}$ (۰/۲۵) (۰/۲۵)	
۹- $CH_3-C \equiv C-CH_3$ (ب) ج) ظرف (۱) $C_{15}H_{32}$ - ظرف (۲) $C_{11}H_{24}$ (هر مورد ۰/۵ نمره) الف) 	
۱۰- الف) $Q = mC\Delta\theta$ (۰/۵) $C = \frac{Q}{m\Delta\theta} = \frac{188}{80 \times 10} = \frac{188}{800} = 0.235 \Rightarrow$ نقره (۰/۲۵)	
ب) آهن، چون گرمای ویژه ی بیشتری دارد. (۰/۵)	

۱۱- الف) ترمیت (۰/۲۵)، در صنعت جوشکاری (۰/۲۵)

ب)

درصد خلوص Al

$$\frac{80}{100} = \frac{x = 108}{135} \quad \text{۰/۲۵} \quad \text{gr}_{\text{Fe}} = \cancel{108} \text{ g}_{\text{Al}} \times \frac{1 \text{ mol}}{\cancel{27} \text{ g}_{\text{Al}}} \times \frac{\cancel{2} \text{ mol}_{\text{Fe}}}{\cancel{2} \text{ mol}} \times \frac{56 \text{ g}_{\text{Fe}}}{1 \text{ mol}} = 22/4 \text{ g} \quad \text{۰/۲۵}$$

$$\text{Fe بازده} = \frac{25}{100} = \frac{x}{22/4} \Rightarrow 5/6 \quad \text{۰/۲۵}$$

B > E > G

۱۲- الف) چون k فلز، اما

G و E و B هر سه نافلز (هالوژن) و در یک گروه از بالا به پایین خاصیت نافلزی کاهش می یابد.

ب) C < E در یک دوره ثابت چون تعداد لایه ثابت است، با افزایش عدد اتمی (تعداد R نیروی جاذبه هسته بر e ها افزایش

می یابد، شعاع کم می شود.)

$$\text{بازده درصدی} = \frac{\text{عملی}}{\text{نظری}} \times 100 = \frac{33/6}{89/6} \times 100 = 37/5\% \quad \text{۰/۲۵}$$

۱۳-

$$\text{بازده نظری} = 92 \times \frac{1 \text{ mol}}{46 \text{ g}} \times \frac{2 \text{ mol}}{1 \text{ mol}} \times \frac{22/4 \text{ L}}{1 \text{ mol}} = 89/6$$

CO₂ ۰/۲۵ ۰/۲۵ ۰/۲۵ ۰/۲۵



اپلیکیشن درسی همیار

برنامه رایگان درسی همیار



تمام پایه ها

جواب کتاب ، تدریس و نمونه سوال



همیشه رایگان

برنامه همیار کاملا رایگان میباشد